

HNO



- Nicht-interventionelle Studie mit einem neuen Nasenspray: erste Ergebnisse im klinischen Alltag
- Vergleich von 2 verschiedenen Nasensprays – Unterschiede in Wirkungen und Nebenwirkungen – Analyse mittels eines Cross-Over-Designs
- Behinderte Nasenatmung durch geschwollene Schleimhäute und deren Behandlungserfolge durch Akupunktur
- Vergleich der Expression von Angiogenesefaktoren in den Glandula parotis, Glandulae submandibularis und sublingualis
- Vergleich der Ergebnisse verschiedener OP-Verfahren beim Papilloma inversum der Nase
- Prognose nach Brachytherapie bei sinonasalen Tumorerkrankungen
- Vergleich verschiedener Aerosole zur Behandlung der chronischen Rhinosinusitis
- Auswirkung einer Antikoagulation auf das Auftreten von Epistaxis
- Zusammenhang von kardiovaskuläre Risikofaktoren und der Carotis-Intima-Dicke auf Epistaxis
- Risikofaktoren für die Entwicklung von Leukoplakien und Plattenepithelkarzinomen der Nasennebenhöhlen
- Karzinome der Nasennebenhöhlen – Risikofaktoren, Behandlung und Mortalität
- Prognostische Relevanz verschiedener Antigene beim Larynx- Ca
- Vergleich von operativen Therapien des Papilloma inversum der Nase und Nasennebenhöhlen
- 5-Jahres-Überleben von Patienten mit inoperablen Plattenepithelkarzinomen im Kopf-Hals-Bereich nach Durchführung einer hyperfraktioniert-akzelerierten Radiotherapie
- Rezidive, Metastasen und Mortalität bei Tumoren des Oropharynx – Vergleich der Bestrahlung mit VMAT vs. IMRT Step
- Prognostische Bedeutung von neuen Markern bei malignen Tumoren der Mundhöhle und des Larynx – welche Bedeutung hat die Durchflußzytometrie?
- Langzeitüberleben nach Kehlkopfresektionen –Einfluss von VEGF auf die klinischen Verläufe und die Prognose
- Einfluss des HPV bei der Entwicklung von Plattenepithelkarzinomen
- Stimmlippenoberflächen bei Polypen, Reineke Ödemen, Papillomen und anderen benignen Erkrankungen
- Typisierung von unklaren Lymphadenopathien in der HNO-Praxis
- Anwendungsbeobachtung: Etablierung eines neuen Hörgerätes – welche Erfolge können durch beidseitige Anpassung erreicht werden?
- Hörvermögen vor und nach operativer Sanierung mittels Tympanoplastik I, II-V und Stapesplastik
- Vergleich des Hörvermögens nach Verwendung verschiedener Cochleaimplantate
- Einfluss von verschiedenen Rehabilitationsprogrammen auf das Hörvermögen nach Cochlea Implantationen
- Auswirkungen auf das Hörvermögen und die Lebensqualität nach Cochlea-Implantat-Versorgung bei Patienten oberhalb des 65. Lebensjahres
- Audiogramm und Sprachverständnis adoleszenter Patienten nach Implantation von Cochleaimplantaten
- Cochlea-Implantate bei prälingual ertaubten Erwachsenen
- Hörstörungen beim Churg-Strauss-Syndrom
- Auswirkung von Lärmbelastungen während Operationen auf den Operateur

- Auslösung von Nystagmen durch physiologische Reize bei gesunden Probanden - welche Einflüsse lösen die stärksten Nystagmen aus?
- Nystagmen durch verschiedene Auslöser und deren Therapierbarkeit
- Auswirkungen von Zungenpiercing auf die Artikulation
- Entwicklung eines Screeningtests für craniomandibuläre Dysfunktion für den HNO-Arzt

[nach oben](#)